

Rozpoznanie: czerniak skóry

Rok

LP.	WIEK	PŁEĆ	RDZAJ ZABIEGU				pT1	pT2
			BIOPSJA WĘZŁA WARTOWNICZEGO		LIMFADENEKTOMIA			
			WYNIK DADATNI	WYNIK UJEMNY	tak	nie		

- * rutynowe zastosowanie dermatoskopii
- * Dostęp do analizy mutacji BRAF

- * czy biopsja węzła wartowniczego jest rutynowo stosowana we wszystkich lokalizacjach czerniaka skóry o zaawansowaniu przynajmniej pT1b

- * czy stosowana jest limfocyntygrafia plus barwnik w odstępie do 24 godzin od limfocytygrafii

- * czy chirurg w zespole wykonuje przynajmniej 12 limfadenektomii rocznie

- * czy w przypadku limfadenektomii pachowej usuwane są przynajmniej 10 węzłów chłonnych

pT3	pT4	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	UWAGI
		PIERWSZYCH OBJAWÓW	OPERACJI	NAWROTU CHROBY	OSTATNIEJ OBSERWACJ	ZGONU	

TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE